

Danh sách loài côn trùng ở vườn thôn Hòa Thọ, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Chuồn chuồn (Bộ Chuồn chuồn Odonata)

1. *Aciagrion borneensis* (Ris, 1911). Loài chuồn chuồn kim thân mảnh, bụng nhỏ và dài. Thường đậu ở các bụi cỏ thấp. @Phan Toàn
2. *Agriocnemis femina* (Brauer, 1868). Loài chuồn chuồn kim thân mảnh, bụng nhỏ và dài, con đực có phần cuối bụng màu cam, con cái thân có vạch màu cam. Thường đậu ẩn nấp ở trong các bụi cây hoa dại. @Phan Toàn
3. *Ischnura senegalensis* (Rambur, 1842). Loài chuồn chuồn kim nhỏ, thường đậu thấp ở gần mặt đất. Con đực có cơ thể màu xanh-đen, con cái màu xanh-cam. @Phan Toàn
4. *Orthetrum Sabina* (Drury, 1773). Còn gọi là “Chuồn chuồn hổ” do cơ thể của cả con đực và con cái có các sọc xanh-đen vân vện. Có thể bắt gặp ở khắp nơi. @Phan Toàn
5. *Trithemis festiva* (Rambur, 1842). Con đực có màu xanh thẫm, đốt bụng cuối màu vàng nhạt. Cơ thể con cái màu vàng-đen. Chúng thường đậu ở trên mặt đất. Có thể bắt gặp ở khắp nơi. @Phan Toàn

Ruồi (Bộ Hai Cánh Diptera)

1. *Zeugodacus cucurbitae* (Coquillett, 1899). Còn gọi là ruồi đục dưa (Melonfly). Cơ thể màu cam, sọc vàng, cánh có các đốm đen. Chúng thường đậu dưới mặt lá cây hoa, thân cây chuối. @Phan Toàn
2. *Phytomyia chrysopyga* Wiedemann, 1819. Cơ thể có màu đen, phần cuối bụng màu cam. @Phan Toàn
3. *Phytomyia errans* (Fabricius, 1787). Cơ thể có các sọc màu đen, vàng nhạt và màu cam. Đây là hai loài ruồi trong họ Ruồi giả ong Syrphidae. Chúng được tìm thấy ở hoa của cây cúc dại. @Phan Toàn
4. *Episyrphus balteatus* (De Geer, 1776). Ruồi giả ong Syrphidae. Cơ thể màu vàng-cam với các sọc đen ngang ở bụng. Chúng khá nhút nhát, thường ẩn nấp trong các bụi cây dại. @Phan Toàn
5. *Eristalinus* sp1. Một loài thuộc họ Ruồi giả ong Syrphidae. Loài này có màu mắt rất đặc biệt màu đốm màu cam, phần trên ngực có các sọc đen rất đẹp. Bụng màu vàng nhạt. @Phan Toàn
6. *Eristalinus* sp2. Một loài khác cũng thuộc họ Ruồi giả ong Syrphidae. Mắt của loài này màu vàng với các chấm đen. Phần trên ngực màu đen với các sọc nhỏ màu vàng. Bụng có các sọc vàng-đen xen kẽ nhau. @Phan Toàn
7. *Eristalinus* sp3. Một loài khác cũng thuộc họ Ruồi giả ong Syrphidae. Loài này có mắt màu đen, phần trên mắt có các sọc ngang. Ngực màu trắng-đen-cam. Chúng khá nhút nhát, thường ẩn nấp trong các bụi cây dại. @Phan Toàn
8. *Chrysosoma* sp1. Ruồi xanh chân dài thuộc họ Dolichopodidae. Loài rất nhỏ, thường đậu trên lá để ngủ trưa nên cần phải quan sát kỹ. Có thể bắt gặp khắp khu vườn.
9. *Chrysosoma* sp2. Một loài Ruồi xanh chân dài khác. Loài này khác với loài trên bởi bụng mập mập hơn và có các sọc đen ngang (trong khi bụng của loài *Chrysosoma* sp1. mảnh hơn và hoàn toàn màu xanh biếc). @Phan Toàn
10. *Musca domestica* Linnaeus, 1758. Ruồi nhà (họ Muscidae). Loài phổ biến, có thể gặp ở khắp nơi.

11. *Sphaerophoria* sp. Ruồi lính vàng nhỏ thuộc họ Syrphidae. Loài này có phần trước đầu màu trắng, ngực màu đen và bụng màu cam-sọc đen. Chúng dễ tìm thấy ở hoa của cây cúc dại. @Phan Toàn
12. *Cylindromyia* sp. Một loài ruồi thuộc họ Tachinidae. Chúng có số lượng khá ít, thường xuyên di chuyển rất nhanh giữa các bông hoa chứ ít khi đậu. Cánh có hai màu đặc trưng là màu cam (ở gần gốc) và màu đen (ở đầu mút cánh). Bụng màu cam-đen. @Phan Toàn
13. *Phaenicia sericata* (Meigen, 1826). Nhặng xanh (họ Calliphoridae). Chúng dễ tìm thấy gần chuồng gà vịt của vườn. @Phan Toàn
14. *Eristalinus* sp. Một loài khác cũng thuộc họ Ruồi giả ong Syrphidae. Loài này có mắt hoàn toàn sẫm màu, ngực có hai sọc màu vàng dọc ở giữa. Bụng màu cam, mặt trên bụng có vạch đen. Loài khá hiếm gặp ở vườn, chỉ gặp một lần ở bụi cây hoa hướng dương. @Phan Toàn
15. *Hermetia Illucens* (Linnaeus 1758). Ruồi lính đen (Stratiomyidae). Cơ thể gần như hoàn toàn màu đen, đặc trưng bởi hai sợi anten dài. Loài cũng ít gặp, thường ẩn nấp rất kỹ trong bụi cây hoa cúc dại. @Phan Toàn
16. Loài ruồi rất nhỏ chưa biết tên. Phát hiện đậu trên lá chuối gần chuồng gà, vịt của vườn. Cơ thể có màu vàng. @Phan Toàn
17. Loài ruồi khá lớn chưa biết tên. Phát hiện đậu trên lá chuối gần chuồng gà, vịt của vườn. Cơ thể có màu đen, đầu mút cánh có đốm đen. @Phan Toàn
18. Một loài ruồi hạc họ Tipulidae. Nhìn bề ngoài rất giống một con muỗi lớn. Cơ thể có cánh nhiều màu lấp lánh. Phần ngực màu vàng. Chân rất dài. Chúng thường ẩn nấp trong bụi cây ven hàng rào của vườn. @Phan Toàn
19. *Neoitamus* sp. Một loài Ruồi sát thủ thuộc họ Ruồi ăn thịt Asilidae. Loài này có kích thước khá nhỏ, cơ thể và chân có màu hơi vàng. Chúng thường săn bắt các loài côn trùng khác để ăn thịt. Có thể phát hiện sau nhà. @Phan Toàn.
20. Một loài ruồi sát thủ họ Ruồi ăn thịt Asilidae. Loài này có kích thước rất lớn, cơ thể hoàn toàn màu đen và có bụng và chân rất dài. Chúng thường đậu trên mặt đất, săn tìm các loài côn trùng nhỏ khác để ăn thịt. @Phan Toàn.

Ong (Bộ Cánh màng Hymenoptera)

1. *Enicospilus melanocarpus* Cameron, 1905. Một loài Ong ký sinh thuộc họ Ichneumonidae. Chúng thường đậu treo mình ở những cành cây bụi, ẩn nấp rất kỹ nên cần phải quan sát tìm kiếm mới phát hiện. Cơ thể có màu cam, cánh to, bụng phình ra ở cuối và có các đốt bụng cuối có màu đen. @Phan Toàn
2. *Ropalidia* sp. Một loài ong bắp cày họ Vespidae. Thân màu đỏ, bụng vàng, cánh nâu. Thường thấy ở bụi cây cúc dại. @Phan Toàn
3. Một loài ong bắp cày họ Vespidae. Kích thước khá lớn, thân màu đỏ sẫm. Thường thấy ở bụi cây cúc dại. @Phan Toàn
4. Một loài thuộc họ Ong nhện Pompilidae. Loài thường xuyên hoạt động, chui lủi dưới tán các cây bụi để săn mồi. @Phan Toàn
5. Unknown
6. Unknown
7. Unknown
8. Unknown

Bướm (Bộ Cánh vẩy Lepidoptera)

Bướm ngày

1. *Ypthima huebneri*. Bướm nhỏ 4 mắt. Loài bướm rất nhỏ, thường bay lượn ẩn nấp trong các bụi rậm. Mặt trên và mặt ngoài của cánh có một mắt lớn ở cánh trước và 4 mắt nhỏ ở cánh sau. Có thể bắt gặp ở khắp nơi trong vườn. @Phan Toan (mở cánh) @Hoàng Xiếc (khép cánh).
2. *Euploea mulciber*. Bướm đốm xanh lớn. Mặt ngoài cánh có màu nâu với các đốm trắng rải rác, mặt trên cánh trước có mảng màu xanh dương sáng. Loài phổ biến, gặp ở khắp nơi. @Phan Toàn.
3. *Cethosia cyane*. Bướm hồ vắn. Cánh có màu vàng với sọc đen đặc trưng. Loài phổ biến, gặp ở khắp nơi. @Phan Toàn.
4. *Parantica aglea*. Bướm cổ đốm xanh. Loài có kích thước khá lớn, cánh có các đốm, sọc màu xanh. Loài phổ biến, gặp ở khắp nơi. @Phan Toàn.
5. *Zemeros flegyas*. Bướm nâu nhỏ. Loài khá nhỏ, cánh màu cam với các đốm đen khắp cánh. Loài phổ biến, gặp ở khắp nơi. @Phan Toàn.
6. *Elymnias hypermnestra*. Bướm cau. Mặt trên cánh có màu tím than, xanh sẫm, xanh sáng và màu cam rất đẹp. Khi khép cánh mặt ngoài có màu đỏ gạch (nên có tên gọi là bướm cau – màu của quả cau). Loài này phát hiện ở sau nhà. @Phan Toàn.
7. *Mycalesis mineus*. Bướm bụi nâu đen. Mặt trên của cánh trước gần như có màu nâu và có 2 con mắt lớn ở mỗi bên. Mặt dưới cánh có một hàng gồm 7 mắt nhỏ ở mỗi cánh. Loài này phát hiện ở sau nhà. @Phan Toàn.
8. *Catochrysops panormus*. Bướm xanh đuôi 1 chấm. Loài rất nhỏ, mặt trên của hai cánh có màu xanh nhạt, cuối cánh sau gần với “đuôi” cánh có một chấm đen nhỏ. Mặt ngoài của cánh có sọc màu xanh trắng, và có một đốm đen, viền cam ở ngoài gần với “đuôi” cánh. Loài phổ biến, gặp ở khắp nơi. @Phan Toàn.
9. *Acytolepis puspa*. Bướm xanh puspa. Loài bướm nhỏ, mặt trên cánh có mảng màu xanh nhạt, mặt dưới có các đốm màu nâu và đen. Loài phổ biến, gặp ở khắp nơi. @Phan Toàn.
10. *Junonia lemonias*. Bướm hoa nâu. Mặt trên của cánh có 2 đôi mắt lớn màu đen, viền ngoài màu cam rất đặc trưng. Loài này phát hiện ở sau nhà. @Phan Toàn.
11. *Potanthus* sp. Bướm nhảy cánh vàng. Cơ thể nhỏ, cánh màu vàng, sọc đen. Chúng di chuyển rất nhanh giữa các bông hoa. Loài phổ biến, gặp ở khắp nơi. @Phan Toàn.
12. *Pelopidas assamensis* (de Nicéville, 1882). Bướm nhảy nâu lớn. Loài bướm nhảy có kích thước khá lớn, cánh màu nâu, ít hoạt động. Thấy ở gần chuồng gà, vịt. @Phan Toàn.
13. *Iambrix salsala* Moore, 1866. Bướm nhảy nâu đỏ. Loài này khá giống với loài Bướm nhảy nâu lớn, nhưng kích thước nhỏ hơn và cánh có các đốm màu trắng. Gặp ở sau nhà. @Phan Toàn.
14. *Pelopidas agna* (Moore, 1866). Bướm cuốn lá lớn. Chúng thường gặp ở các bụi hoa. Nhìn bề ngoài khá giống bướm nhảy cánh vàng nhưng cánh nâu. @Phan Toàn.
15. *Potanthus* sp. Bướm nhảy nhỏ đốm vàng. Khá giống với Bướm cuốn lá lớn nhưng cánh có các sọc vàng rất đẹp. Thường gặp ở bụi cây hoa dại. @Phan Toàn.
16. *Leptosia nina* (Fabricius, 1793). Bướm cánh chuồn. Loài bướm khá nhỏ, rất phổ biến gặp ở khắp nơi. Cánh màu trắng, hơi thuôn giống cánh chuồn chuồn. @Phan Toàn.

17. *Pterophorus* sp. Ngài lông chim. Một loài ngài rất nhỏ, cánh có hình dạng giống lông chim nên được gọi là ngài lông chim. Chân mảnh, nhiều gai, thường đứng im bất động trên mặt lá. Gặp ở hàng rào của vườn. @Hoàng Xiéc.

Bộ Cánh cứng (Bộ Cánh cứng Coleoptera)

1. *Podontia affinis* (Grondal, 1817). Một loài bọ rùa trong họ Bộ ánh kim Chrysomelidae. Loài này ăn lá, phần đầu, ngực và chân có màu cam, phần cánh có màu trắng và sọc ngang màu đen rất đẹp. Chúng là loài phá hoại, ấu trùng được phủ bởi một lớp nhày nhựa nhìn như bãi phân chim để tránh các loài khác ăn thịt. Cả ấu trùng và con trưởng thành đều có mùi rất hôi, không nên bắt bằng tay không. @Hoàng Xiéc.
2. Bọ Rùa 2
3. Bọ Rùa 3
4. Bọ Rùa 4
5. Bọ Rùa 5
6. Bọ Rùa 6
7. Bọ Rùa 7
8. Bọ Rùa 8
9. Bọ Rùa 9
10. Ban miêu
11. Xén tóc
12. Unknown
13. Unknown
14. Unknown
15. Unknown
16. Unknown
17. Unknown
18. Unknown
19. *Ophionea indica*
20. Bọ hung
21. Ấu trùng Bộ cánh cứng